

Диспансеризация 2 этап

Назначается врачом-терапевтом :

1. Дуплексное сканирование бронхицефальных артерий:

- по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением;
- для мужчин от 45 до 72 лет, для женщин от 54 до 72 лет - повышенный уровень артериального давления + гиперхолестеринемия + избыточная масса тела или ожирение.

2. Врач-невролог:

- анкета: перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения, не состоит на Д учете.
- анкета: первичное выявление нарушений двигательных функций, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию с 65 лет, не состоит на Д учете.

3. Врач-хирург или врач-уролог:

- для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл.

4. Врач-хирург или врач-колопроктолог, включая ректороманоскопию:

- анкета: для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки
- назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки.

5. Спирометрия:

- для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание,
- курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования,
- по назначению врача-терапевта

6. Врач-акушер-гинеколог:

- для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки,

- в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез.

7. Врач-оториноларинголог:

- для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта.

8. Врач-офтальмолог:

- для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление,
- для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования.

9. Врач-дерматовенеролог(включая проведение дерматоскопии):

- для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфотических узлов.

10. Рентгенографию легких, компьютерную томографию легких

- для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача

11. Эзофагогастродуоденоскопия

- для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта).

12. Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови:

- для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации.

Назначается врачом-хирургом :

13. Колоноскопия:

- для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога.

14. Углубленное профилактическое консультирование проводит врач-терапевт, специалист кабинета медицинской профилактики:

- с выявленной ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, хронической ишемией нижних конечностей

атеросклеротического генеза или болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением;

- с выявленным по результатам анкетирования риском пагубного потребления алкоголя и (или) потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача;

- для всех граждан в возрасте 65 лет и старше в целях коррекции выявленных факторов риска и (или) профилактики старческой астении.